

Traitement par les diurétiques

Traitement par les diurétiques :

Références : PIJ-medic n°18

- *Au sein d'une même famille, les diurétiques présentent globalement un profil efficacité/risque comparable et sont donc en principe interchangeables.*
- *Les effets indésirables les plus préoccupants des diurétiques concernent les électrolytes. En particulier les hypokaliémies pour les diurétiques thiazidiques et de l'anse et les hyperkaliémies pour les antagonistes de l'aldostérone.*
- *Afin de limiter l'apparition d'effets indésirables, il est préférable de débiter un traitement diurétique par de petites doses, et d'augmenter progressivement la posologie selon la réponse clinique.*
- *Les diurétiques thiazidiques perdent leur efficacité en cas de Clcr inférieure à 30 ml/min (à l'exception de la metolazone). D'autre part, une dose supérieure à 25 mg/jour de chlortalidone ou d'hydrochlorothiazide accroît davantage le risque d'effets indésirables que l'efficacité du médicament (plus particulièrement chez les patients âgés).*
- *L'effet complet des diurétiques sur la tension artérielle se manifeste en quelques semaines.*

Source : Liste des médicaments à consulter sur www.pij.ch

© Pharmacie Interjurassienne : Ce contenu n'est pas autorisé à être copié et repris sur un autre site WEB ou tout autre média.